

GROCH

NAZWA ŚRODKA (SUBSTANCJA CZYNNNA)	DAWKA	UWAGA	ZWALCZANE CHWASTY		
BBCH 00 (BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE DO 3 DNI)					
Aflex Super 450 SC (linuron)	1,0-2,0 l/ha	Podczas bardzo intensywnych opadów bezpośrednio po siewie, rośliny grochu mogą wschodzić lekko uszkodzone – objawy przemijają	gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa		
Linurex 500 SC (linuron)	0,9 l/ha				
Dongola 450 (linuron)	1l/ha				
Nuflon 450 SC (linuron)	1,0-2,0 l/ha				
Command 360 CS (chlomazon)	0,25 l/ha	Stosować na dobrze uprawioną, bez grud glebę	bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, i purpurowa, krzywoszyj polny, poziwnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne		
Command 480 EC (chlomazon)	0,2 l/ha				
Clomaz 36 CS (chlomazon)	0,25 l/ha				
Golden Clomazon 360 CS (chlomazon)	0,25 l/ha				
Golden Clomazon 480 EC (chlomazon)	0,2 l/ha				
Kilof 480 EC (chlomazon)	0,2 l/ha				
Szpada 480 EC (chlomazon)	0,2 l/ha				
Harier 295 ZC (chlomazon+linuron)	1,5-2,0 l/ha				
Stop Aqua 455 CS (pendimetalina)	2,5-3,5 l/ha			Zalecany w grochu jadalnym zielonym	chwastnica jednostronna, fiołek polny i trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, rdest ptasi i plamisty, rumian polny, tasznik pospolity wiechlina roczna
Boxer 800 EC (prosulfukarb)	3-4l/ha			Tylko w grochu pastewnym. Stosować do 5 dni po siewie.	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, komosa biała, przetacznik bluszczowy, przetacznik perski, przytulia czepna
Stallion 363 CS (chlomazon+pendimetalina)	3,0l/ha	Przesuszone gleba osłabia działanie preparatu	chwastnica, dymnica, fiołek, gwiazdnica, jasnoty, komosa, niezapominajka polna,		

			psianka, przetacznik bluszczykowy przetacznik perski, przytulia czepna
BBCH> 12 (OD WYKSZTAŁCENIA PRZEZ GROCH DWÓCH LIŚCI WŁAŚCIWYCH)			
Agil 100 ES (propachizafop)	0,5-1,5 l/ha	Dawki wyższe przeznaczone są do zwalczania perzu właściwego i wiechliny rocznej	Gatunki jednoliścienne (samosiewy zbóż, gatunki jednoroczne, perz właściwy)
Agil-S ES (propachizafop)	0,5-1,5 l/ha		
Aria 100 EC (propachizafop)	0,5-1,5 l/ha		
Focus Ultra 100 EC (cykloksydym)	1,5-3,0 l/ha		
Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-P-butylu)	0,5-2,5 l/ha		
BBCH 11-13 (FAZA 1-3 WĄSÓW CZEPNY)			
Butoxone M 400 SL	3,0- 4,0 l/ha	Odmiana grochu jadalnego Opal może być wrażliwa na działanie środka	gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
BBCH 12-16 (WYSOKOŚĆ ROŚLIN 6-12 CM)			
Agro Bentazon 480 SL (bentazon)	2,5-3,0 l/ha	Można stosować łącznie z dodatkiem adiuwanta Olbras 88EC w dawce 2l środka zawierającego bentazon +1,5l adiuwanta	dymnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa i purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamiasty i powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Basagran 480 SL (bentazon)	2,5-3,0 l/ha		
Mac- Bentazon 480 SL (bentazon)	2,5-3,0 l/ha		
Realchemie Bentazon (bentazon)	2,5-3,0 l/ha		
Wolof A 480 SL (bentazon)	2,5-3,0 l/ha		
Wolof B 480 SL (bentazon)	2,5-3,0 l/ha		
Wolof C 480 SL (bentazon)	2,5-3,0 l/ha		
Corun 502,4 SL (bentazon+imazamoks)	1,0-1,25 l/ha	Należy stosować łącznie z dodatkiem adiuwanta Olbras 88EC	bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy i polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

BOBIK

NAZWA ŚRODKA (SUBSTANCJA CZYNNA)	DAWKA	UWAGA	ZWALCZANE CHWASTY
BBCH 00 (BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE DO 3 DNI)			
Aflex Super 450 SC (linuron)	1,5-2,0 l/ha		gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtnica drobnokwiatowa
Nuflon 450 SC (linuron)	1,5-2,0 l/ha		
Boxer 800 EC (prosulfukarb)	3,0-4,0 l/ha	Stosować do 5 dni po siewie.	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

ŁUBIN(BIAŁY, WĄKOLISTNY, ŻÓŁTY)

NAZWA ŚRODKA (SUBSTANCJA CZYNNA)	DAWKA	UWAGA	ZWALCZANE CHWASTY
BBCH 00 (BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE DO 3 DNI)			
Afalon Dyspersyjny 450 SC (linuron)	1,25-1,5 l/ha	Zalecenia na odpowiedzialność stosującego w ramach ochrony upraw małoobszarowych	gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtnica drobnokwiatowa
Boxer 800 EC (prosulfukarb)	3,0-4,0 l/ha	Stosować do 5 dni po siewie.	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna
BBCH> 12 (OD WYKSZTAŁCENIA PRZEZ ŁUBIN DWÓCH LIŚCI WŁAŚCIWYCH)			

Fusilade Forte 150 EC (fluazifop-P-butylu)	0,75- 1,0 l/ha		Tylko jednoliścienne gatunki, samosiewy zboż
---	----------------	--	--